

## Calendrier d'interdiction d'épandage

Occupation du sol	Type de fertilisants azotés	Janv.	Fev.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
<b>Sols non cultivés</b>	Tous	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Cultures implantées à l'automne ou en fin d'été (autres que colza) : céréales d'hiver, épinards d'été...</b>	I	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	II	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	III	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Colza implanté à l'automne</b>	I	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	II	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	III	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Cultures implantées au printemps (blé et orge de printemps, betteraves sucrières, maïs, pois protéagineux, carotte, endive racine, épinard de printemps, haricot, pois potager, oignon) non précédées par une CIPAN ou une culture dérobée</b>	FCP et CEE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	I	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	II	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	III	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Cultures implantées au printemps (blé et orge de printemps, betteraves sucrières, maïs, pois protéagineux, carotte, endive racine, épinard de printemps, haricot, pois potager, oignon) précédées par une CIPAN ou une culture dérobée</b>	FCP et CEE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	I	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	II	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	III	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Prairies implantées depuis plus de 6 mois dont prairies permanentes, luzerne</b>	I	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	II	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	III	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Chou, Poireau, Epinard d'hiver</b>	I	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	II	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	III	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Vignes et Vergers</b>	I	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	II	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	III	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Autres cultures (cultures maraîchères* et cultures porte-graines)</b>	I	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	II	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	III	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

**FCP et CEE** : Fumier Compact Pailleux et Composts d'Effluents d'Elevage. Peuvent également être considérés comme relevant de cette colonne certains effluents relevant d'un plan d'épandage sous réserve que l'effluent brut à épandre ait un C/N 25 et que le comportement du dit effluent vis à vis de la libération d'azote ammoniacal issu de sa minéralisation et vis à vis de l'azote du sol est telle que l'épandage n'entraîne pas de risque de lixiviation de nitrates.

**Cultures maraîchères\*** : Les périodes d'interdiction de la ligne "autres cultures" s'appliquent aux cultures maraîchères, définies comme des cultures de légumes sur des parcelles consacrées presque exclusivement à des légumes (une autre culture peut parfois y être implantée mais la rotation comprend une grande majorité d'années en légumes). Elles ne s'appliquent pas aux cultures de légumes en rotation avec d'autres cultures (céréales, oléagineux, cultures industrielles...) qui se rattachent aux autres lignes (où elles sont citées).

**M** : Mais seulement

■ épandage interdit  
■ épandage autorisé

■ épandage autorisé sous certaines conditions  
■ règles particulières liées à l'implantation d'une CIPAN ou d'une culture dérobée

■ épandage interdit zone 1 et 2 (sauf pour les légumes)  
50 U épandage autorisé en zone 2 dans la limite de 50 kg d'azote efficace/ha