



## Avec le premier passage des animaux, apparaissent les refus !

POUSSE DE L'HERBE (kgMS/j/ha)

SOMME DES TEMPERATURES BASE 1er FEVRIER  
(au 05 mai 2024)




### CONSEIL PÂTURAGE

Après le premier passage des animaux sur les parcelles, apparaissent les refus. Ces zones non consommées par les animaux peuvent être particulièrement nombreuses lors d'une mise à l'herbe tardive et avec un chargement trop faible. L'augmentation de ce dernier lors du prochain passage peut permettre de faire consommer ces refus, d'autant plus si le couvert est inférieur à 15cm. Le broyage est quant à lui adapté lorsqu'il y a peu de refus et que la hauteur d'herbe est faible (peu après la sortie des animaux). Sur un couvert plus haut, les refus peuvent être fauchés et ensuite pâturés le lendemain par des animaux à faibles besoins. L'ébousage permet de décompacter les bouses pour favoriser leur dégradation. Le meilleur moyen reste néanmoins le débrayage des parcelles lorsque la prairie est supérieure à 17cm.

### CONSEIL FAUCHE

Après les récoltes en enrubannage ou en ensilage suivi de l'apport de fertilisation azoté, il faut laisser en moyenne 3-5 semaines avant de retourner sur les parcelles pour les deuxièmes coupes. Les pluies qui ont suivies devraient permettre une bonne valorisation de l'azote. En attendant, les semis de maïs ont démarré dans les sols les plus réchauffés (supérieur à 10°C).



### Cumuls pluviométriques de 1<sup>er</sup> janvier au 06 mai (mm)

Charente	Confolens	473
	Montbron	492
Charente-Maritime	Trizay	378
	Vouhé	424
Deux-Sèvres	Bressuire	444
	Parthenay	494
	Melle	497
Vienne	Rouillé	476
	Lathus	446
	Lesigny	346

Alizée Breton (86) 06 79 42 74 47 - Marie Escure (16) 06 25 64 14 04 - Anne-Laure Lemaître (17-79) 06 07 35 82 12



PRDA Nouvelle-Aquitaine, AE3 Systèmes sobres en intrants et intégration de la biodiversité, avec le soutien du Conseil Régional et de l'Europe



Partenaires :

